

## 1. Introdução


Os dados recolhidos através do BES incluem todos os casos clínicos suspeitos diagnosticados nas consultas e nos Internamentos em todos os níveis de atenção. Como norma, todos os casos suspeitos devem ser investigados e confirmados laboratorialmente.

## 2. Indicadores de vigilância epidemiológica do sarampo baseada no caso em 2007

Em 2007 foram notificados no BES, 267 casos suspeitos de Sarampo com 1 óbito (Gaza), contra 184 casos e 0 óbitos no mesmo período do ano anterior. Estes dados espelham uma evolução de 45,1% do número casos, devido à alteração na definição de caso.

Dos casos notificados em 2007, apenas 183 (72%) foram investigados, tendo apenas 1 sido positivo para IgM do Sarampo e 75 foram positivos para IgM da Rubéola.

**Gráfico N°1:** Casos de Sarampo suspeitos notificados e investigados, Janeiro –Dezembro de 2007



**FONTE:** BES/Fichas de investigação de caso

A análise por Província mostrou um substancial incumprimento das normas de vigilância para esta doença, à semelhança do PFA; dos 98 casos notificados pela Cidade de Maputo só 47 foram investigados, enquanto que Inhambane notificou 22 e investigou apenas 1. Esta discrepância espelha o nível de incumprimento das normas em vigor no País.

Para o sarampo foram notificados em 2007, 44 óbitos no D03/4 contra 1 no BES. As províncias de Nampula, Tete e Maputo apresentaram diferenças relativas ao número de casos, enquanto que Niassa, Zambézia, Tete e Gaza notificaram os restantes óbitos.


## Epidemiologia do sarampo baseada no caso em 2008

Em 2008 foram notificados no BES, 475 casos suspeitos de Sarampo, contra 272 casos e 1 óbito no mesmo período do ano anterior. Estes dados espelham uma evolução de 74.6% do número de casos.

Dos casos notificados em 2008, apenas 379 (79.8%) foram investigados, tendo apenas 4 sido positivo para IgM do Sarampo e 166 foram positivos para IgM da Rubéola.

Apesar da melhoria verificada, a Taxa de detecção permanece ainda muito baixa (0.9/100.000 habitantes), sendo a recomendada pela OMS de 2/100.000. Igualmente, permanece ainda elevado o número de distritos silenciosos no País (>45,5%).

**Gráfico Nº2:** Casos de Sarampo suspeitos notificados e investigados, Janeiro a Dezembro de 2008



FONTE: BES/Fichas de investigação de caso

A análise por província mostrou um substancial incumprimento das normas de vigilância para esta doença, à semelhança do PFA; por exemplo, dos 108 casos notificados pela Cidade de Maputo só 63 foram investigados, Nampula notificou 65 casos e investigou apenas 10 casos enquanto que Inhambane notificou 46 e investigou 72.

Ainda, a comparação do número de casos e óbitos por Sarampo notificados no D03/4 vs BES mostrou que o somatório dos em 2008, 597 casos e 37 óbitos contra os 445 casos e 0 óbitos no BES.

Esta discrepância espelha o nível de incumprimento das normas em vigor no País, pelo que se recomenda-se que os dados dos Internamento sejam incluídos no BES da Unidade Sanitária; que os dados destes subsistemas sejam analisados e compatibilizados antes do seu envio para os níveis superiores.